

Rapports d'avancement nationaux - Burkina Faso

Rapport mondial d'avancement sur la lutte contre le sida 2020



Table des matières

- I. Global - Objectifs Accélérer la Riposte
- II. Cascade du test et traitement du VIH - Garantir l'accès au traitement aux 30 millions de personnes vivant avec le VIH grâce à l'atteinte des objectifs 90–90–90 d'ici 2020
- III. Prévention de la transmission mère-enfant du VIH - Éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants d'ici 2020 et garantir l'accès au traitement du VIH à 1,6 millions d'enfants d'ici 2018
- IV. Programmes de prévention du VIH; Populations clés - Assurer l'accès aux options de l'association de mesures de prévention, parmi lesquelles la prophylaxie préexposition, la circoncision masculine volontaire médicale, la réduction des risques et les préservatifs, à au moins 90 % des personnes d'ici 2020, en particulier les jeunes femmes et les adolescentes dans les pays à forte prévalence et les populations clés, c'est-à-dire les homosexuels et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes transgenres, les professionnels du sexe et leurs clients, les personnes qui s'injectent des drogues et les prisonniers
- V. Genre; Stigma et discrimination - Éliminer les inégalités entre les sexes et mettre fin à toutes les formes de violence et de discrimination envers les femmes et les filles, les personnes vivant avec le VIH et les populations clés d'ici 2020
- VI. Connaissance du VIH et accès aux services de santé sexuelle et reproductive - S'assurer que 90 % des jeunes possèdent les compétences, les connaissances et la capacité de se protéger du VIH et disposent d'un accès à des services de santé sexuelle et reproductive d'ici 2020 afin de réduire à moins de 100 000 personnes par an le nombre de nouvelles infections à VIH parmi les adolescentes et les jeunes femmes
- VII. Protection sociale - S'assurer que 75 % des personnes vivant avec le VIH, affectés par le VIH ou à risque bénéficient de la protection sociale incluant le VIH d'ici 2020
- VIII. Prestation de services à base communautaire - Garantir la gestion par la communauté d'au moins 30 % des services fournis d'ici 2020

- IX. Dépenses associées au VIH - Garantir l'augmentation des investissements liés au VIH à hauteur de US\$ 26 milliards d'ici 2020, dont un quart pour la prévention du VIH et 6% pour les acteurs sociaux
- X. Renforcement et accès à la justice - Responsabiliser les personnes vivant avec le VIH, à risque ou bien affectées par le VIH afin qu'elles connaissent leurs droits, aient accès à la justice et à des services juridiques afin de prévenir et lutter contre les violations des droits de l'homme
- XI. Sortir le sida de l'isolement - S'engager à sortir le sida de l'isolement par le biais de systèmes centrés sur les populations afin d'améliorer la couverture de santé universelle, notamment le traitement pour la tuberculose, le cancer du col de l'utérus et les hépatites B et C

Global

Objectifs Accélérer la Riposte


Résumé des progrès

Le gouvernement burkinabé a fait de la lutte contre le VIH, le Sida et les IST, un défi majeur. Depuis les années 1998, le Burkina Faso a fait, le choix stratégique d'une approche multisectorielle, décentralisée et participative marquée par une mobilisation sociale généralisée à travers l'implication de tous les acteurs du plus haut niveau politique et de tous les secteurs d'activités et à toutes les échelles de l'organisation territoriale et administrative du pays.

Le rapport de sérosurveillance de 2018 donne une prévalence globale du VIH de 1,2% [1,0-1,4] contre 1,3% [1,0-1,5] chez les 15 à 49 ans en fin 2017. Des disparités existent selon les tranches d'âge et le milieu de résidence. Par exemple pour les 15-24 ans cette prévalence est de 0,84% [0,6-1,1] contre 0,86% [1,1-1,6] en fin 2017.

3.1 Incidence du VIH par 1000, Burkina Faso (2010-2019)


Nombre de nouvelles infections à VIH pendant la période de référence par population de 1 000 personnes non infectées



Source: fichier Spectrum

1.6 Mortalité due au sida par 100000, Burkina Faso (2010-2019)

Nombre total de personnes qui sont décédées d'une maladie due au sida sur une population de 100 000 personnes



Source: fichier Spectrum

Cascade du test et traitement du VIH

Garantir l'accès au traitement aux 30 millions de personnes vivant avec le VIH grâce à l'atteinte des objectifs 90–90–90 d'ici 2020

Résumé des progrès

Parmi les 74 551 PVVIH de la file active en T1 2019, 67 067 sont sous traitement ARV soit 89,96% de couverture de la file active

Questions de politique (2019)

Existe-t-il une loi, une réglementation ou une politique spécifiant que le dépistage du VIH :

a) Est obligatoire avant le mariage

Non

b) Est obligatoire pour obtenir un permis de travail ou de résidence

Non

c) Est obligatoire pour certains groupes

Non

Quel est le seuil de CD4 recommandé pour débiter un traitement antirétroviral chez les adultes et les adolescents asymptomatiques, selon les directives du ministère de la Santé (MS), et à quel stade en est sa mise en oeuvre?

Pas de seuil, traitement pour tous indépendamment de la numération de CD4; Mise en oeuvre dans tout le pays (> 95 % des établissements de prise en charge)

Votre pays possède-t-il une politique nationale actuelle sur le test systématique de la charge virale pour effectuer le suivi de la thérapie antirétrovirale et dans quelle mesure est-elle mise en oeuvre ?


a) Pour les adultes et les adolescents

Oui; Mise en oeuvre dans tout le pays (> 95 % des établissements de prise en charge)

b) Pour les enfants


Oui; Mise en oeuvre dans tout le pays (> 95 % des établissements de prise en charge)

Cascade du test VIH et du traitement, Burkina Faso (2019)



Source: fichier Spectrum


Progrès vers les objectifs 90-90-9, Burkina Faso (2019)



Source: fichier Spectrum

1.1 Personnes vivant avec le VIH et connaissant leur statut sérologique, Burkina Faso (2010-2019)


Nombre de personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut sérologique



Source: fichier Spectrum

1.2 Personnes vivant avec le VIH recevant un traitement antirétroviral, Burkina Faso (2010-2019)


Nombre de personnes recevant un traitement antirétroviral



Source: fichier Spectrum

1.3 Personnes vivant avec le VIH dont la charge virale a été supprimée, Burkina Faso (2010-2019)


Nombre de personnes vivant avec le VIH dont la charge virale a été supprimée au cours de la période de référence



Source: fichier Spectrum


1.5 Rupture de stock de médicaments antirétroviraux, Burkina Faso (2019)

Pourcentage de sites de traitement en rupture de stock d'un ou de plusieurs médicaments antirétroviraux nécessaires sur une période déterminée



1.6 Mortalité due au sida sur une population de 100 000 personnes, Burkina Faso (2010-2019)


Nombre total de personnes qui sont décédées d'une maladie due au sida sur une population de 100 000 personnes



Source: fichier Spectrum

1.6 Mortalité due au sida sur une population de 100 000 personnes (adultes 15+), Burkina Faso (2010-2019)


Nombre total d'adultes qui sont décédées d'une maladie due au sida sur une population de 100 000 personnes



Source: fichier Spectrum

1.7 Volume de dépistage et dépistage positif du VIH, Burkina Faso

Le pourcentage de tests positifs transmis aux personnes (dépistage positif) au cours de l'année calendaire



Nombre de tests réalisés = 1 293 141

Prévention de la transmission mère-enfant du VIH

Éliminer les nouvelles infections à VIH chez les enfants d'ici 2020 et garantir l'accès au traitement du VIH à 1,6 millions d'enfants d'ici 2018

Résumé des progrès

En 2019, au Burkina Faso:

*534 enfants ont bénéficié d'un diagnostic précoce du VIH (PCR à 2 mois);

*26 enfants nés de mères séropositives ont été dépistés VIH+;

*2 634 femmes enceintes séropositives ont reçu un traitement prophylactique complet aux ARV pour prévenir le risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant

*440 764 femmes enceintes ont été testées au VIH dans le cadre de la CPN

Questions de politique (2019)

Votre pays a-t-il mis en place un plan national pour l'élimination de la transmission mère-enfant (TME) du VIH ?

Oui

Objectif(s) concernant le taux de transmission de la mère à l'enfant et l'année 2%; 2020

Objectif(s) d'élimination (tels que le nombre de cas/population) et l'année -


Les directives nationales recommandent-elles le traitement de tous les nourrissons et les enfants séropositifs, indépendamment de leurs symptômes ? Si oui, quel est le statut de mise en oeuvre de la politique d'âge limite adoptée dans votre pays ?

Traitement pour tous, indépendamment de l'âge

Mise en oeuvre dans tout le pays (> 95 % des établissements de prise en charge)


2.1 Diagnostic infantile précoce, Burkina Faso (2011-2019)

Nombre de nourrissons ayant subi un test virologique pour le VIH au cours de leurs deux premiers mois de vie



2.1 Diagnostic infantile précoce, Burkina Faso (2018-2019)


Pourcentage de nourrissons nés de femmes vivant avec le VIH qui subissent des tests virologiques dans les deux mois suivant la naissance



↑ 32.07% (2018)


2.2 Transmission mère-enfant du VIH, Burkina Faso (2010-2019)

Pourcentage estimé d'enfants ayant été nouvellement infectés par le VIH dans le cadre de la transmission de la mère à l'enfant chez les femmes séropositives ayant accouché au cours des 12 derniers mois




Source: fichier Spectrum

2.3 Prévention de la transmission mère-enfant du VIH, Burkina Faso (2011-2019)



2.3 Prévention de la transmission mère-enfant du VIH, Burkina Faso (2018-2019)


Pourcentage de femmes enceintes vivant avec le VIH qui ont reçu des médicaments antirétroviraux en vue de réduire le risque de transmission mère-enfant



↓ 96.3% (2018)


2.4 La syphilis chez les femmes enceintes, Burkina Faso (2019)

Pourcentage de femmes qui ont fait l'objet d'un dépistage de syphilis




2.4 La syphilis chez les femmes enceintes, Burkina Faso (2019)

Pourcentage de femmes enceintes dont le test de dépistage de la syphilis s'est révélé positif



2.4 Syphilis chez les femmes enceintes, Burkina Faso (2019)

Pourcentage de femmes sous traitement parmi celles séropositives




2.5 Taux de syphilis congénitale (naissances vivantes et mortinaissances), Burkina Faso (2013-2019)

Nombre de cas de syphilis congénitale déclarés (naissances vivantes et mortinaissances)



2.6 Test du VIH chez les femmes enceintes, Burkina Faso (2018-2019)

Pourcentage de femmes enceintes séropositives dont le statut VIH est connu



↓ 92.2% (2018)

Programmes de prévention du VIH; Populations clés

Assurer l'accès aux options de l'association de mesures de prévention, parmi lesquelles la prophylaxie préexposition, la circoncision masculine volontaire médicale, la réduction des risques et les préservatifs, à au moins 90 % des personnes d'ici 2020, en particulier les jeunes femmes et les adolescentes dans les pays à forte prévalence et les populations clés, c'est-à-dire les homosexuels et les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes transgenres, les professionnels du sexe et leurs clients, les personnes qui s'injectent des drogues et les prisonniers

Résumé des progrès

*L'incidence du VIH est de 0,11‰

*Taille des populations clés suivantes : TS : 21 858 ; HSH : 3 458 ; Détenus : 5 619

*Prévalence du VIH : TS: 5,4%; HSH : 1,9% ; Détenus : 2,15%.

Questions de politique : Populations clés (2019)

Criminalisation et/ou poursuite des populations clés

Personnes transgenres

- Ni criminalisées ni poursuivies en justice

Professionnels du sexe

- Tirer profit de l'organisation ou de la gestion de services sexuels est criminalisé

Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

- Pas de loi spécifique

La consommation de drogues ou la détention de drogues pour usage personnel constituent-elles un délit dans votre pays ?

- La loi autorise la détention d'une certaine quantité de drogues
- La détention ou la consommation de drogues constituent une infraction
- La détention de drogues pour usage personnel constitue une infraction

Protections juridiques pour les populations clés

Personnes transgenres

- Ni criminalisées ni poursuivies en justice

Professionnels du sexe

- Non

Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes

- Non

Personnes qui s'injectent des drogues


- Non

La recommandation de l'OMS sur la PrEP orale a-t-elle été adoptée dans les lignes directrices nationales de votre pays?

Oui, les recommandations relatives à la PrEP ont été adoptées mais ne sont pas encore mises en oeuvre

3.1 Incidence du VIH par 1000, Burkina Faso (2010-2019)


Nouvelles infections à VIH pendant la période de référence par population de 1 000 personnes non infectées (Adultes, 15 à 49 ans)



Source: fichier Spectrum


3.3 Prévalence du VIH parmi les populations clés, Burkina Faso (2011-2019)

Pourcentage de populations clés spécifiques vivant avec le VIH




3.4 Dépistage du VIH parmi les populations clés, Burkina Faso (2016-2019)

Pourcentage de personnes d'une sous-population clé testées pour le VIH dans les 12 derniers mois ou qui connaissent leur statut sérologique VIH actuelle




3.6 Utilisation du préservatif parmi les populations clés, Burkina Faso (2011-2019)

Pourcentage parmi une population clé indiquant avoir utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel



3.7 Couverture des programmes de prévention du VIH parmi les populations clés, Burkina Faso (2016-2019)

Pourcentage de personnes au sein d'une population clé qui indiquent avoir bénéficié d'un ensemble intégré d'interventions de prévention du VIH




3.11 Syphilis active chez les professionnels du sexe, Burkina Faso (2011-2019)

Pourcentage de professionnels du sexe présentant une syphilis active




3.12 Syphilis active parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, Burkina Faso (2011-2019)

Pourcentage d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et présentant une syphilis active




3.13 Programmes de prévention du VIH dans les prisons, Burkina Faso (2019)

Programmes de prévention et de traitement du VIH offerts aux prisonniers en détention




3.19 Nombre annuel de préservatifs distribués, Burkina Faso (2019)

Nombre de préservatifs distribués au cours des 12 derniers mois



3.19 Nombre annuel de préservatifs distribués, Burkina Faso (2019)

Nombre de préservatifs distribués au cours des 12 derniers mois



Genre; Stigma et discrimination

Éliminer les inégalités entre les sexes et mettre fin à toutes les formes de violence et de discrimination envers les femmes et les filles, les personnes vivant avec le VIH et les populations clés d'ici 2020

Résumé des progrès

Selon l'EDS IV, 57,5% des personnes vivant avec le VIH sont victimes de discrimination car seulement 42,5% des enquêtés ont répondu Oui à la question achèteriez-vous des légumes frais à un commerçant vivant avec le virus du Sida.

Questions de politique (2018)

Votre pays a-t-il établi un plan ou une stratégie national(e) afin de lutter contre la violence sexiste et la violence faite aux femmes incluant les problématiques de prévention à VIH ?

Oui

Votre pays possède-t-il une loi concernant la violence domestique ?

Oui

- Violence physique
- Violence sexuelle
- Violence psychologique
- Violence économique
- Criminalisation explicite du viol conjugal

Quelles protections, si existent, votre pays a-t-il pour les populations clés et les personnes vivant avec le VIH contre la violence ?

- Droit pénal général interdisant la violence
- Actions de lutte contre la torture et le mauvais traitement en prison


Votre pays a-t-il mis en place des politiques exigeant que les établissements de santé fournissent des soins en temps opportun et de qualité à toutes les personnes, indépendamment de leur genre, nationalité, âge, handicap, ethnie, origine, orientation sexuelle, religion, langue, statut socio-économique, statut VIH ou autre état de santé, ou parce qu'elles ont recours au sexe tarifé, consomment des drogues, vivent en prison ou pour toute autre raison ?

Oui, des politiques existent et sont mises en oeuvre de manière systématique

Votre pays a-t-il adopté des lois criminalisant la transmission du VIH, la non-divulgence de la séropositivité ou l'exposition à la transmission du VIH ?

Non, mais le droit pénal général prévoit des poursuites

Pourcentage des indicateurs mondiaux de suivi du SIDA avec des données ventilées par sexe



1 / 4

Connaissance du VIH et accès aux services de santé sexuelle et reproductive

S'assurer que 90 % des jeunes possèdent les compétences, les connaissances et la capacité de se protéger du VIH et disposent d'un accès à des services de santé sexuelle et reproductive d'ici 2020 afin de réduire à moins de 100 000 personnes par an le nombre de nouvelles infections à VIH parmi les adolescentes et les jeunes femmes

Résumé des progrès

Selon l'EMDS (INSD 2015) 72,35% des personnes de 15 à 24 ans ont une connaissance exacte des moyens de prévention du VIH. Selon ces mêmes données, on constate que la connaissance en matière de prévention du VIH semble être corrélée avec l'âge et le sexe.

Questions de politique (2018)

Votre pays a-t-il établi des politiques d'éducation aidant à l'enseignement de compétences essentielles liées au VIH et à l'éducation sexuelle, en accord avec les standards internationaux, dans :

a) Les écoles primaires

Oui

b) Les écoles secondaires

Oui

c) La formation des enseignants

Oui

Protection sociale

S'assurer que 75 % des personnes vivant avec le VIH, affectés par le VIH ou à risque bénéficient de la protection sociale incluant le VIH d'ici 2020

Questions de politique (2019)

Existe-t-il dans votre pays une stratégie, une politique ou un cadre de protection sociale approuvé(e) ?

Oui, et celui-ci/celle-ci est mis en oeuvre

a) Fait-il/elle référence au VIH ?

Oui

b) Reconnaît-il/elle les personnes vivant avec le VIH comme bénéficiaires clés ?

Oui

c) Reconnaît-il/elle les populations clés (professionnels du sexe, homosexuels et autres hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, personnes qui s'injectent des drogues, personnes transgenres, prisonniers) comme bénéficiaires clés ?

Oui

• Professionnels du sexe

d) Reconnaît-il/elle les adolescentes et les jeunes femmes comme bénéficiaires clés ?

-

e) Reconnaît-il/elle les enfants touchés par le VIH comme des bénéficiaires clés ?

-

f) Reconnaît-il/elle les familles touchées par le VIH comme des bénéficiaires clés ?

-

g) Tient-il/elle compte du problème des soins non rémunérés liés au VIH ?

-

Quels obstacles, si existent, limitent l'accès aux programmes de protection sociale dans votre pays?

• Les programmes de protection sociale n'intègrent pas les personnes vivant avec le VIH, les populations clés et/ou les personnes touchées par le VIH

• Crainte de la stigmatisation et de la discrimination

• Manque de pièces justificatives permettant l'éligibilité, telles que les cartes nationales d'identité

• Frais restants à la charge du patient élevés

Prestation de services à base communautaire

Garantir la gestion par la communauté d'au moins 30 % des services fournis d'ici 2020

Questions de politique (2019)

Votre pays a-t-il une politique nationale pour promouvoir l'administration de thérapie antirétrovirale dans les communautés ?

Oui

Existe-t-il au moins l'une des garanties suivantes dans les lois, les réglementations et les politiques assurant le fonctionnement des OSC ou des OC dans votre pays ?

- L'inscription d'OSC oeuvrant pour la lutte contre le VIH est possible
- L'inscription d'OSC/OC travaillant avec les populations clés est possible
- Des services liés au VIH peuvent être proposés par des OSC/OC
- Des services peuvent être proposés aux populations clés par des OSC/OC
- Les exigences en matière de rapports pour les OSC/OC proposant des services liés au VIH sont simplifiées

Dépenses associées au VIH

Garantir l'augmentation des investissements liés au VIH à hauteur de US\$ 26 milliards d'ici 2020, dont un quart pour la prévention du VIH et 6% pour les acteurs sociaux

Résumé des progrès


En 2018 :

*Les dépenses totales de la lutte contre le VIH s'élèvent à 31 120 296 817 FCFA


*Les dépenses pour le dépistage et le conseil en matière de VIH s'élèvent à 4 985 174 467 FCFA

*Les dépenses pour la thérapie antirétrovirale s'élèvent à 10 831 678 318 FCFA


8.2 Les prix unitaires moyens des traitements antirétroviraux (en Dollars US), Burkina Faso (2018-2019)



8.3 Dépenses liées au VIH par catégorie de programmes, Burkina Faso (2013-2019)



Part de la prévention efficace du total, Burkina Faso (2019)



■ Prévention ciblée

■ Autre prévention

■ Autres dépenses associées au

Renforcement et accès à la justice

Responsabiliser les personnes vivant avec le VIH, à risque ou bien affectées par le VIH afin qu'elles connaissent leurs droits, aient accès à la justice et à des services juridiques afin de prévenir et lutter contre les violations des droits de l'homme

Résumé des progrès

Révision de la loi 030 portant lutte contre le Sida et protection des droits des PVVIH (révision sous l'appui technique et financier du PNUD)

Questions de politique (2018)

Y a-t-il eu au cours de ces deux dernières années des programmes de formation et/ou de renforcement des capacités pour les personnes vivant avec le VIH et les populations clés afin de les éduquer et de les sensibiliser concernant leurs droits (dans le contexte du VIH) dans votre pays ?

Oui, à petite échelle

Des mécanismes ont-ils été mis en place dans votre pays pour enregistrer et traiter des cas de discrimination liés au VIH (fondée sur la séropositivité perçue et/ou l'appartenance à une population clé) ?

Oui

Quels mécanismes de responsabilisation relatifs à la discrimination et aux violations des droits de l'homme dans les établissements de santé votre pays a-t-il, si existent?

- Procédure de plainte
- Mécanismes de recours
- Procédures ou systèmes pour préserver et respecter la vie privée ou le droit à la confidentialité des patients

Quels obstacles à l'accès aux mécanismes de responsabilisation votre pays a-t-il, si existent?

- Les mécanismes ne sont pas opérationnels
- Les contraintes financières pour les personnes faisant partie de groupes marginalisés et touchés
- La sensibilisation ou les connaissances relatives au fonctionnement de ces mécanismes sont limitées

Sortir le sida de l'isolement

S'engager à sortir le sida de l'isolement par le biais de systèmes centrés sur les populations afin d'améliorer la couverture de santé universelle, notamment le traitement pour la tuberculose, le cancer du col de l'utérus et les hépatites B et C

Résumé des progrès

*215 nouveaux cas et rechutes de patients co-infectés TB/VIH reçoivent à la fois le traitement antituberculeux et le traitement VIH en 2019

*308 nouveaux enrôlés ont été dépistés et pris en charge pour la tuberculose parmi les patients pris en charge pour des soins liés au VIH

Questions de politique (2019)

Le dépistage et le traitement du cancer du col de l'utérus sont-ils recommandés pour les femmes vivant avec le VIH dans :

a) La stratégie/politique/plan/directive national(e) pour le cancer, le cancer du col de l'utérus ou la riposte plus large aux maladies non transmissibles (MNT)

Oui

b) Le plan stratégique national régissant la riposte au sida

Oui

c) Directives nationales sur le traitement du VIH


Oui

Quelles politiques de co-infection sont mises en place dans le pays pour les adultes, les adolescents et les enfants ?

- Traitement préventif par isoniazide (TPI) ou prophylaxie de l'infection tuberculeuse latente (ITBL) pour les personnes vivant avec le VIH
- Intensification du dépistage de la tuberculose parmi les personnes vivant avec le VIH
- Contrôle de l'infection tuberculeuse dans les établissements de santé proposant des services liés au VIH
- Prophylaxie à base de cotrimoxazole
- Dépistage de l'hépatite B et prise en charge dans les centres médicaux administrant des traitements antirétroviraux
- Dépistage de l'hépatite C et prise en charge dans les centres médicaux administrant des traitements antirétroviraux


10.1 Co-gestion du traitement de la tuberculose et du VIH, Burkina Faso (2011-2019)

Nombre de patients nouvellement diagnostiqués séropositifs et en situation de rechute de la tuberculose ayant commencé un traitement contre la TB au cours de la période de référence et qui étaient déjà sous traitement antirétroviral, ou qui ont commencé un traitement antirétroviral pendant le traitement contre la TB au cours de l'année de référence




10.2 Personnes vivant avec le VIH atteintes d'une tuberculose active, Burkina Faso (2015-2019)

Nombre total de personnes vivant avec le VIH et souffrant d'une tuberculose (TB) active, exprimé en pourcentage des nouveaux patients pris en charge pour des soins liés au VIH (pré-traitement antirétroviral et traitement antirétroviral) au cours de la période de référence



10.3 Personnes vivant avec le VIH qui ont commencé un traitement préventif antituberculeux, Burkina Faso (2015-2019)

Nombre de patients ayant commencé un traitement pour une infection tuberculeuse latente, exprimé en pourcentage du nombre total de nouveaux patients nouvellement inscrits aux soins du VIH au cours de la période considérée



10.4/10.5 Infections sexuellement transmissibles, Burkina Faso (2013-2019)

Nombre de cas d'écoulement urétral chez l'homme déclarés au cours des 12 derniers mois; nombre de cas de blennorragie diagnostiqués en laboratoire chez les hommes dans les pays ayant des capacités de diagnostic en laboratoire

